

Bivirkningstabell

Bivirkninger som er rapportert ved bruk av cannabidiol i placebokontrollerte kliniske studier, er oppgitt i tabellen nedenfor etter organklassesystem og frekvens.

Frekvensene er definert på følgende måte: svært vanlige ($\geq 1/10$); vanlige ($\geq 1/100$ til $< 1/10$); mindre vanlige ($\geq 1/1\,000$ til $< 1/100$). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Tabell 3: Bivirkningstabell

Organklassesystem	Frekvens	Bivirkninger fra kliniske studier
Infeksiøse og parasittære sykdommer	Vanlige	Pneumoni ^a
		Urinveisinfeksjon
Sykdommer i blod og lymfatiske organer	Svært vanlige	Redusert hemoglobin
		Redusert hematokritt
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer	Svært vanlige	Nedsatt appetitt
Psykiatriske lidelser	Vanlige	Irritabilitet
		Aggresjon
Nevrologiske sykdommer	Svært vanlige	Somnolens ^a
	Vanlige	Letargi
		Krampeanfall
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum	Vanlige	Hoste
Gastrointestinale sykdommer	Svært vanlige	Diaré
	Vanlige	Oppkast
		Kvalme
Sykdommer i lever og galleveier	Vanlige	Forhøyet ASAT
		Forhøyet ALAT
		Forhøyet GGT
Hud- og underhudssykdommer	Vanlige	Utslett
Sykdommer i nyre og urinveier	Vanlige	Forhøyet kreatinin i blodet
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet	Svært vanlige	Feber
		Fatigue
Undersøkelser	Vanlige	Vekttap

^a Grupperte termer: **Pneumoni:** Pneumoni, RSV-pneumoni, mykoplasmapneumoni, adenoviral pneumoni, viral pneumoni, aspirasjonspneumoni; **Somnolens:** Somnolens, sedasjon.